

### **Instrukcja pobierania próbek kału w kierunku rota/adenowirusów oraz norowirusów**

Próbki kału są materiałem potencjalnie zakaźnym, dlatego podczas pobierania i transportu próbek należy przestrzegać zasad postępowania zawartych w niniejszej instrukcji.

- Kał w kierunku rota- i adenowirusów należy pobrać w okresie ostrych objawów choroby (najlepiej od 3 do 5 dnia od pojawienia się pierwszych objawów).  
Kał w kierunku norowirusów należy pobrać w 2 - 3 dniu choroby (ostre objawy).
- Kał należy oddać do czystego pojemnika lub na papier, a następnie pobrać grudkę kału wielkości dużego orzecha włoskiego lub 1-2 ml kału płynnego do czystego pojemnika tzw. „kałówki”.
- Pojemnik dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania próbki.
- Próbkę dostarczyć do laboratorium możliwie jak najszybciej, najlepiej w ciągu 6 h po pobraniu. Do czasu dostarczenia przechowywać w temp. 2-8°C. Maksymalny czas dostarczenia próbki do laboratorium od chwili pobrania – 2 dni. Przechowywanie do czasu transportu w temp. 2-8°C.
- Wypełnić czytelnie i dokładnie „Zlecenie na badanie próbek kału/wymazów z odbytu” PL – 01/IR – 01/MLM/HP/F – 08 i dostarczyć do laboratorium wraz z pobraną próbką.